Test d'anticossos

Autor:
Data de publicació: 01-08-2020

PROVA D'UNA INFECCIÓ PASSADA
Actualitzat el 2 de febrer de 2021

Les proves d'anticossos o serologia cerquen anticossos a la sang per determinar si heu tingut una infecció anterior amb el virus que causa COVID-19.

Els anticossos són proteïnes creades pel sistema immunitari del cos poc després d'haver estat infectat o vacunat. Els anticossos us ajuden a combatre les infeccions i us poden protegir contra la malaltia de nou. El temps que pot durar aquesta protecció és diferent per a cada malaltia i per a cada persona.

Les proves d'anticossos no s'han d'utilitzar per diagnosticar una infecció actual amb el virus que causa COVID-19, excepte en els casos en què les proves virals es retardin. És possible que una prova d'anticossos no mostri si teniu una infecció actual, perquè el cos pot trigar entre 1 i 3 setmanes en produir anticossos.

Tant si feu proves positives com negatives de COVID-19 en un test viral o anticòs, encara heu de prendre mesures per protegir-vos a vosaltres i als altres .

No sabem la quantitat de protecció (immunitat) que poden proporcionar els anticossos contra el virus contra la infecció de nou. S'han informat de casos confirmats i sospitosos de reinfecció, però continuen sent poc freqüents. Els científics treballen per entendre-ho.

COM OBTENIR UNA PROVA D'ANTICOSSOS
Les decisions sobre les proves es prenen a nivell estatal o localicona externa departaments sanitaris o proveïdors sanitaris.

Les proves d'anticossos per al COVID-19 estan disponibles a través de proveïdors d'atenció mèdica i laboratoris. Consulteu amb el vostre proveïdor d'atenció mèdica per veure si ofereixen proves d'anticossos i si n'heu de fer una.

QUÈ VOLEN DIR ELS VOSTRES RESULTATS?
SI DONEU POSITIU

Un resultat positiu de la prova demostra que és possible que tingueu anticossos d'una infecció amb el virus que causa COVID-19. No obstant això, hi ha la possibilitat que un resultat positiu signifiqui que teniu anticossos d'una infecció amb un virus diferent de la mateixa família de virus (anomenats coronavirus). Nota: Altres coronavirus d'una altre família no poden produir un resultat positiu en una prova viral de SARS-CoV-2.
Tenir anticossos contra el virus que provoca el COVID-19 pot proporcionar protecció contra una nova infecció del virus. Però encara que sigui així, no sabem quanta protecció poden proporcionar els anticossos ni quant de temps pot durar aquesta protecció. S'han informat de casos confirmats i d'alguns sospitosos de reinfecció, però continuen sent poc freqüents.
Parleu amb el vostre proveïdor d'atenció mèdica sobre el resultat de la prova i el tipus de prova que heu fet per entendre què significa el vostre resultat. El vostre proveïdor us pot suggerir que feu un segon tipus de prova d'anticossos per veure si la primera prova era exacta.
Heu de continuar protegint-vos a vosaltres i als altres, ja que segueix havent-hi la possibilitat de tornar a infectar-vos amb el virus.

Si treballeu en un lloc de treball on porteu equips de protecció individual (EPI), continueu usant EPI.

Podeu donar positiu en anticossos fins i tot si mai no heu tingut símptomes de COVID-19. Això pot passar si teniu una infecció sense símptomes, que s'anomena infecció asimptomàtica.

SI DONEU NEGATIU

És possible que no hagueu tingut mai COVID-19. Parleu amb el vostre proveïdor d'atenció mèdica sobre el resultat de la prova i el tipus de prova que heu fet per entendre què significa el vostre resultat.
Podríeu tenir una infecció actual o estar recentment infectat.

La prova pot ser negativa perquè normalment el cos triga entre 1 i 3 setmanes en produir anticossos. És possible que encara pugueu emmalaltir si heu estat exposats al virus recentment. Això vol dir que encara podeu propagar el virus. Algunes persones poden trigar encara més a desenvolupar anticossos i és possible que algunes persones infectades no desenvolupin mai anticossos.

Si es presenten símptomes després de la prova d'anticossos, és possible que necessiteu una altra prova anomenada proves virals . Les proves virals identifiquen el virus en mostres del vostre sistema respiratori, com ara un hisop de l'interior del nas.

Independentment de si feu una prova positiva o negativa, els resultats no confirmen si podeu propagar el virus que provoca COVID-19. Fins que no en sabem més, continueu prenent mesures per protegir-vos a vosaltres i als altres .

Obteniu més informació sobre l' ús de proves d'anticossos per cercar infeccions passades.

mà que sosté la icona de llum mèdica

Per a professionals sanitaris

Per obtenir informació sobre com avaluar i provar la infecció activa, consulteu les recomanacions per a la presentació d'informes, proves i recollida de mostres .

Per obtenir orientacions provisionals dels CDC sobre les proves d'anticossos en entorns clínics i de salut pública, consulteu les Directrius provisionals per a les proves d'anticossos COVID-19 .

Més informació

Treball de CDC en proves d'anticossos
Autoritzacions d'ús d'emergència de la FDA per a COVID-19icona externa
Rendiment de la prova de serologia autoritzada per EUAicona externa
Proves d'anticossos (serologia) per a COVID-19: informació per a pacients i consumidorsicona externa